

Fungizide zur Förderung der Standfestigkeit und zur Phomabekämpfung im Winterraps

Artikel	Wirkstoffe	Wirkstoff- gehalt g/kg ml/l	Formulierung	Aufwand- menge	Anwendungszeit- raum Herbst	Wachstumsregulierung	Wirkung auf Phoma	Anzahl Anwendungen in der Kultur	Gewässer- auflagen	75% Gewässerabstand	90% Gewässerabstand	Randstreifen bei Hangneigung > 2%	NT-Auflagen
Ampera	Prochloraz Tebuconazol	267 133	EC	1,5 l/ha	ab 6 Blatt-Stadium	XX	XX(X)	2	NW 605 NW 606 NW 701	5	*	10	-
Carax	Mepiquatchlorid Metaconazol	210 30	SL	1,4 l/ha	ab 2 Blatt-Stadium	XXX	XX	2	NW 609	*	*	0	-
Efilor	Metaconazol Boscalid	60 133	SC	1,0 l/ha	ab 2 Blatt-Stadium	XX	XX(X)	2	NW 605 NW 606	*	*	0	-
Folicur Tebucur	Tebuconazol	250	EW	1,0 - 1,5 l/ha	4 - 8 Blatt-Stadium	XX	XX	2	NW 605 NW 606 NW 701	5	5	10	NT 101
Orius	Tebuconazol	200	EC	1,5 l/ha	ab 6 Blatt-Stadium	XX	XX	2	NW 605 NW 606 NW 701	5	*	10	-
Helocur	Tebuconazol	250	EW	1,5 l/ha	ab 6 Blatt-Stadium	XX	XX	2	NW 605 NW 606 NW 701	5	*	10	-
Tilmor	Tebuconazol Prothioconazol	160 80	EW	1,2 l/ha	ab 2 Blatt-Stadium	XX	XX(X)	2	NW 605 NW 606 NW 701	5	*	10	-
Toprex	Paclobutrazol Difenoconazol	125 250	SC	0,5 l/ha	ab 4 Blatt-Stadium	XX(X)	XX(X)	2	NW 605 NW 606	*	*	0	-

PRODUKTE SIND
KLICKBAR

*länderspezifischer Mindestabstand

Alle Angaben ohne Gewähr. Vor Anwendung bitte stets Etikett und die aktuelle Produktinformation lesen.