

Fungizide in Kartoffeln

Auflagen

Produkt	Firma	Gewässerabstand (m)					Rand- streifen bei Hang- neigung > 2 %	Abstand zu Saumbiotop (m)					sonstige Auflagen Aufbrauchfrist
		Gewässerauflagen	Standard	50 %	75 %	90 %		NT- Auflagen	Standard	50 %	75 %	90 %	
Systemische Wirkung / durchschnittliche Wirkungsdauer 11 Tage 1)													
Zorvec Endavia	Corteva	NW 642-1	*	*	*	*			0	0	0	0	WW 764 Wirkstoffwechsel
Zorvec Enicade Nzeb Manzate	Corteva	NW 642	*	*	*	*			0	0	0	0	31.12.2021
		NW 607	-	-	20	10		NT 102	20	20	0	0	
Ridomil Gold MZ	Syngenta	NW 605/606	15	10	5	5			0	0	0	0	31.12.2021
Infinto	Bayer	NW 609	5	*	*	*			0	0	0	0	NG 324, NG 325
Proxanil Winby	Belchim	NW 642, NG 402	*	*	*	*	10		0	0	0	0	
		NW 605/606/701	10	5	5	*	10		0	0	0	0	
Ranman Top	Belchim	NW 609/705	5	*	*	*	5		0	0	0	0	
Proxanil	UPL	NW 642, NG 402	*	*	*	*	10		0	0	0	0	
Rival Duo	Adama	NW 642, NG 402	*	*	*	*	10		0	0	0	0	
Lokal- / Teilsystemische, translaminare Wirkung / durchschnittliche Wirkungsdauer 11 Tage 1)													
Banjo Forte	Adama	NW 605/606	10	5	5	*			0	0	0	0	
Carial Flex	Syngenta	NW 642	*	*	*	*			0	0	0	0	
Cymbal flow + Ranman Top	Belchim	NW 642	*	*	*	*			0	0	0	0	
Cymbal flow + Shirlan	Belchim	NW 605/606	5	5	*	*			0	0	0	0	
Curzate M	FMC	NW 607	-	-	20	10			0	0	0	0	31.12.2021
Plexus (Terminus Extra)	FMC	NW 605/606	15	10	5	5			0	0	0	0	
Valbon	Certis	NW 605/606	10	5	5	*		NT 101	20	0	0	0	31.12.2021
Valis M	Belchim	NW 607	-	-	20	10			20	0	0	0	31.12.2021
Revus	Syngenta	NW 642	*	*	*	*			0	0	0	0	
Acrobat Plus WG	BASF	NW 605/606	10	5	5	*		NT 101	20	0	0	0	31.12.2021
Tanos	Corteva	NW 607, NW 706	-	20	10	5	20		0	0	0	0	

*= länderspezifischer Mindestabstand.

Auflagen

Produkt	Firma	Gewässerabstand (m)					Rand- streifen bei Hang- neigung > 2 %	Abstand zu Saumbiotop (m)					Aufbrauchfrist
		Gewässerauflagen	Standard	50 %	75 %	90 %		NT- Auflagen	Standard	50 %	75 %	90 %	
Kontaktwirkung / durchschnittliche Wirkungsdauer 8 Tage 1)													
Dithane Neo Tec	Certis	NW 605/606	20	10	5	5		NT 101	20	0	0	0	31.12.2021
Tridex DG	UPL	NW 605/606	15	10	5	5		NT 101	20	0	0	0	31.12.2021
Polyram WG	BASF	NW 607	-	15	10	5			0	0	0	0	
Sporen abtötende Wirkung / durchschnittliche Wirkungsdauer 8 – 10 Tage 1)													
Shirlan / Winby	Syngenta / Belchim	NW 605/606/701	10	5	5	*	10		0	0	0	0	
Terminus / Carneol / Nando 500 SC	FMC Adama Nufarm	NW 605/606	10	5	5	*			0	0	0	0	
		NW 605/606						NT 101	20				
Ranman Top	Belchim	NW 609, NW 705	5	*	*	*	5		0	0	0	0	
Shaktis	Nufarm	NW 607	-	-	15	10		NT 109	25	25	25	5	31.12.2021
Spezialfungizide zur Alternariabekämpfung													
Narita	Belchim	NW 606/605	5	5	*	*			0	0	0	0	
Revus Top	Syngenta	NW 605/606	5	5	5	*			0	0	0	0	
Ortiva	Syngenta	NW 609	5	*	*	*			0	0	0	0	
Signum	BASF	NW 609	5	*	*	*			0	0	0	0	
Dagonis	BASF	NW 609-1	5	*	*	*			0	0	0	0	

1) Bei starkem Infektionsdruck und schnellem Krautwachstum verminderte, bei Trockenheit längere Wirkungsdauer.

*= länderspezifischer Mindestabstand.