

Herbizide in Leguminosen

Übersicht

Produkt	Wirkstoffe	Formulierung	Wirkstoffgehalt g/kg ml/l	Einsatzzeitpunkt BBCH	Ackerbohne	Futtererbse	Lupine	Sojabohne	Wirkungsspektrum												Anzahl Anwendungen in der Kultur	
									Ackerfuchschwanz	Windhalm	Hirse	Knöterich	Klette	Kamille	Gänsefuß	Hohlzahn	Taubnessel	Stiefmütterchen	Ehrenpreis	Vogelmiere		Nachtschatten
Bandur	Aclonifen	SC	600	VA	4,0 l/ha	4,0 l/ha	-	-	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	1
Boxer/Roxy	Prosulfocarb	EC	800	VA	5,0 l/ha	5,0 l/ha	5,0 l/ha	-	x(x)	xxx	x	x(x)	xxx	x(x)	x	xx	xxx	x	xxx	xxx	x(x)	1
Gardo Gold	Terbuthylazin S-Metolachlor	SC	187,5 312,5	VA	-	-	4,0 l/ha	-	x	xx	xxx	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	xx	xx	x	1
Novitron DamTec	Aclonifen Clomazone	WG	500 30	VA	2,4 kg/ha	2,4 kg/ha	-	-	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	1
Spectrum Plus	Pendimethalin Dimethenamid-P	EC	250 212,5	VA	4,0 l/ha	4,0 l/ha	4,0 l/ha	4,0 l/ha	x(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	1
						4,0 l/ha																
Stomp Aqua	Pendimethalin	CS	455	VA	4,4 l/ha	4,4 l/ha	2,6 l/ha	2,6 l/ha	x(x)	xx	x	xx	xx	xx	xx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	1
				NA		3,0 l/ha																
Centium 36 CS	Clomazone	CS	360	VA	0,25 l/ha	0,25 l/ha	-	0,25 l/ha				xx	xxx		xx		xxx		x	xxx	x(x)	1

Herbizide in Leguminosen – Auflagen

Produkt	Firma	Gewässerabstand (m)					Rand- streifen bei Hang- neigung > 2 %	Abstand zu Saumbiotop (m)					sonstige Auflagen
		Gewässerauflagen	Standard	50 %	75 %	90 %		NT-Auf- lagen	Standard	50 %	75 %	90 %	
Bandur	Bayer	NW 607, NW 701	-	10	5	5	10	NT 108	25	25	5	5	WP 712
Boxer/Roxy	Syngenta	NW 642	-	-	-	*			-	-	-	5	NT 145/146/170, WP 733
Gardo Gold	Syngenta	NW 609, NG 402	5	*	*	*	10	NT 102	20	20	-	-	
Novitron DamTec	FMC	NW 607, NW 701	-	20	15	5	10	NT 108	25	25	5	5	NT 127, NT 149, WP 734, WP 713
Spectrum Plus	BASF	VA: NW 607, NW 706, NG 405	-	-	-	5	20	NT 112	-	-	-	-	NT 145/146/170, WP 710, WP 734
		NA: NW 607, NW 706											
Stomp Aqua	BASF	VA: NW 607	-	-	-	10		NT 112	-	-	-	5	NT 145/146/170, WP 710, WP 734
		NA: NW 605	-	-	-	5		NT 112	-	-	-	5	
Centium 36 CS	Belchim	NW 642	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0	NT 127, NT 149, WP 734

Übersicht

Produkt	Wirkstoffe	Formu- lierung	Wirkstoff- gehalt g/kg, ml/l	Aufwand- menge l/ha	Ackerbohne	Futtererbse	Lupine	Anwendungs- zeitpunkt	Wirkungsspektrum					Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anzahl Anwendungen
									Ackerfuchs- schwanz	Windhalm	Flughäfer	Hirschen	Quecke			
Agil-S	Propaquizafop	EC	100	0,75 l/ha	x	x	-	NA	xx ¹	xxx	xx	xxx	-	F	B4	1
Focus Ultra	Cycloxydim	EC	100	2,5 l/ha	x	x	-	NA	xxx	xxx	xxx	xxx	-	56	B4	1
				5,0 l/ha	x	x	-						xxx			
Fusilade Max	Fluazifop-P	EC	107	1,0 l/ha	x	x	-	NA	xx ¹	xxx	xxx	xx(x)		F	B4	1
				2,0 l/ha	-	x	-						xx			
Gallant Super	Haloxifop-P	EC	104	0,5 l/ha	x	x	-	NA	xx ¹	xxx	xxx	xx(x)	-	F	B4	1
Panarex	Quizalofop-P	EC	31,8	1,25 l/ha	x	x	-	NA	xx ¹	xxx	xxx	xx(x)	-	60	B4	1
				2,5 l/ha	x	x	-						xx			
Select EC 240 ² + Radiamix	Clethodim	EC	240	0,5 + 1,0 l/ha		x	x	NA	xx	xxx	xxx	xx(x)	xx	F	B4	1
				1,0 + 1,0 l/ha	x				xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx			

¹=nur sensitive Typen, ²= nur in Beständen zur Saatguterzeugung (außer Lupine)

Graminizide in Leguminosen – Auflagen

Produkt	Firma	Gewässerabstand (m)					Rand- streifen bei Hang- neigung > 2 %	Abstand zu Saumbiotop (m)					sonstige Auflagen
		Gewässer- auflagen	Standard	50 %	75 %	90 %		NT-Auflagen	Standard	50 %	75 %	90 %	
Agil-S	Adama	NW 642	*	*	*	*	-		0	0	0	0	WP 734
Focus Ultra	BASF	NW 642	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0	
		NW 642	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0	
Fusilade Max	Syngenta	NW 642	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0	
		NW 642	*	*	*	*	-	NT 103	20	20	20	0	
Gallant Super	DOW	NW 642	*	*	*	*	-		0	0	0	0	NG 345*
Panarex	Arysta	NW 642	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0	
		NW 642	*	*	*	*	-	NT 103	20	20	20	0	
Select EC 240 ² + Radiamix	Arysta	NW 642	*	*	*	*	-	NT 108	25	25	5	5	
		NW 642	*	*	*	*	-	NT 109	25	25	25	5	

*= länderspezifischer Mindestabstand. Informationen zu den gelisteten Auflagen finden Sie auf den Seiten 128 bis 131 dieser Broschüre.

Übersicht

Produkt	Wirkstoffe	Wirkstoffgehalt g/kg ml/l	Formulierung	Aufwandmenge ml/g/ha					Anzahl Anwendungen	Bienenschutz	Wartezeit in Tagen	Hinweise zur Zulassung
				beißende Insekten	saugende Insekten	Blattläuse	Blattrandkäfer	Erbsenwickler				
Bulldock Top	Lambda-Cyhalothrin	50	EG	150	150				1	B4	7	
Cypermethrin		500	EC			50	50		1	B1	14	auch in Lupinen gegen Blattrandkäfer
Jaguar	Lambda-Cyhalothrin	100	CS				75		1	B4	7	Ackerbohnen
						75	75	75	2	B4	28	Erbsen
Karate Zeon	Lambda-Cyhalothrin	100	CS	75	75				2	B4	7	Abstand 10-14 Tage
Lamdex Forte	Lambda-Cyhalothrin	50	WG	150	150				2	B4	7	Abstand 10-14 Tage
Shock Down	Lambda-Cyhalothrin	50	EC			150	150	150	2	B2	25	
Pirimor Granulat	Pirimicarb	500	WG			300			2	B4	35	

Insektizide in Leguminosen – Auflagen

Produkt	Firma	Gewässerabstand (m)					Randstreifen bei Hangneigung > 2 %	Abstand zu Saumbiotop (m)					sonstige Auflagen Aufbrauchfrist
		Gewässer- auflagen	Standard	50 %	75 %	90 %		NT-Auflagen	Standard	50 %	75 %	90 %	
Bulldock Top	Certis	NW 605/606	20	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5	VV 603
Cypermethrin	UPL	NW 607	-	-	20	10	-	NT 109	25	25	25	5	
Jaguar	Plantan	Ackerbohne: NW 607	-	20	10	5	-	NT 108	25	25	5	5	
		Erbse: NW 607	-	-	-	10		NT 108	25	25	5		
Karate Zeon	Syngenta	NW 607	-	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5	
Lamdex Forte	Adama	NW 605/606	20	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5	
Shock Down	Plantan	NW 607	-	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5	
Pirimor Granulat	Adama	NW 609	5	*	*	*	-	-	0	0	0	0	30.04.2022

*= länderspezifischer Mindestabstand. Informationen zu den gelisteten Auflagen finden Sie auf den Seiten 128 bis 131 dieser Broschüre.