

SU HYCARDI (B)

Sehr früher, ertragsstarker Grannenweizen.



Vorteile:

- Französische Zulassung aus 2021
- sehr früher Einzelährentyp mit Grannen
- gute Resistenzeigenschaften (insbesondere Mehltau, Gelbrost und Braunrost)
- sehr hohe Relativerträge in französischen Prüfungen

Anbau:

Anbauhinweise zum Hybridweizen können dem Ergebnisteil entnommen werden

sehr gute Stoppelweizeneignung

CTU-tolerant

Kurzprofil:


Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Entwicklung

Druschreife



Neigung zu


Auswinterung



Trockenstress




Lager



Anfälligkeiten


Ährenfusarium




Halmbruch



Mehltau



Gelbrost



SU HYCARDI (B)

Sehr früher, ertragsstarker Grannenweizen.

Braunrost	3
Blattseptoria	4
Ertragsaufbau	
Fallzahlstabilität	0
Rohproteingehalt	4

SU HYCARDI (B)

Sehr früher, ertragsstarker Grannenweizen.

Entwicklung:

Ährenschieben			3						
Druschreife				4					
Pflanzenlänge					5				

Ertragsparameter:

Körner je Ähre						6			
TKM					5				
Kornertrag Stufe 1									9
Kornertrag Stufe 2								8	

Vitalität & Gesundheit:

Winterfestigkeit							7		
Trockentoleranz							7		
Standfestigkeit						6			
Halbbruch				4					
Mehltau							7		
Gelbrost							7		
Braunrost							7		
Blattseptoria						6			
Fusariumresistenz						6			

Vermarktungsqualität:

Fallzahl					5				
Fallzahlstabilität	0								
Rohproteingehalt				4					

SU HYCARDI (B)

Sehr früher, ertragsstarker Grannenweizen.

Verarbeitungsqualität:

Volumenausbeute

6

SU HYCARDI (B)

Sehr früher, ertragsstarker Grannenweizen.

Aussaat:

Saatzeittoleranz	früh, Mitte September~spät, Mitte Oktober
frühe Aussaat	deutlich geringer, z.B. 100-110
mittlere Aussaat	etwas geringer, z.B. 130-150
späte Aussaat	etwas geringer, z.B. 150-170

N-Düngung:

startbetont : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 240 (Blattvorfrucht, sehr hohes Ertragsniveau)

Startgabe

EC 13 - 25: 90 - 100 inkl. N_{min 0-30} mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

Spätgabe

EC 47 - 49: 60 – 70, Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler im Intensivanbau mittlere Wachstumsregler-Intensität bei empfohlenen Saatstärken

SU HYCARDI (B)

Sehr früher, ertragsstarker Grannenweizen.

Relative Kornerträge in der unbehandelten und Mittel der behandelten Stufen

Versuch "Sortenoptimierte Fungizidbehandlung Winterweizen Ladenburg" 2023



Quelle: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

01.05.2024

48

