

OPTIMA® | WildLife | HEGEMISCHUNG - Hoch- & Niederwild (Pioniermischung)

Anspruchslose bis mäßig anspruchsvolle Pflanzenarten, liefern auch auf unkultivierten Böden gute Ergebnisse.

- › für Hoch- und Niederwild als Äsungsfläche wie auch zur Deckung geeignet
- › schmackhafte Futtergrundlage durch Dauerstaudenroggen, Buchweizen und Gräser
- › Leguminosen binden Luftstickstoff, der anspruchsvolleren Pflanzen als Nährstoff zur Verfügung steht
- › Verbesserung der Bodenqualität durch gutes Wurzelwachstum von Phacelia und Malve

SAATZEIT:

April	Mai	Juni

AUSSAATSTÄRKE:

25 kg/ha

ZUSAMMENSETZUNG:

20 % Dauerstaudenroggen	5 % Alexandrinerklee
10 % Buchweizen	4 % Phacelia
10 % Einjähriges Weidelgras	4 % Inkarnatklee
8 % Wiesenlieschgras	4 % Rotklee
8 % Serradella	4 % Weißklee
7 % Ölrettich	2 % Malve
7 % Gelbsenf	2 % Gelbklee
5 % Winterfuterraps	

NUTZUNGSDAUER:

einjährig



OPTIMA® | WildLife | NORDISCHER WILDACKERTOPF - Hochwild (Rotwild, Damwild, Schwarzwild)

Universelle Mischung zur Etablierung einer abwechslungsreichen und schmackhaften Äsungsfläche.

- › bietet Deckung sowie vielseitige Futtergrundlage in der Feistzeit, zur Deckung des vielschichtigen Nährstoffbedarfes des Wildes
- › große Komponentenvielfalt, daher für nahezu alle Bodenarten und Lagen geeignet, auch unter ungünstigen Bedingungen Etablierung eines guten Pflanzenbestandes
- › frostharter Pflanzenanteil gibt dem Wild die Chance, unter Schnee Futter zu finden
- › besonders kälteunempfindlich - Winterrübsen, Markstammkohl, Winterfuterraps, Westfälischer Furchenkohl und Kulturmalve

SAATZEIT:

Mai	Juni	Juli	August

AUSSAATSTÄRKE:

25 kg/ha

ZUSAMMENSETZUNG:

25 % Sommerhafer	3 % Perserklee
15 % Süßlupine	2 % Phacelia
15 % Erbse	2 % Alexandrinerklee
8 % Buchweizen	2 % Winterwicke
5 % Ackerbohne	2 % Markstammkohl
5 % Rotklee	2 % Malve
5 % Winterfuterraps	1 % Westfälischer Furchenkohl
4 % Sonnenblume	1 % Rote Möhre
3 % Winterrübsen	

NUTZUNGSDAUER:

ein- bis mehrjährig

