



# DOMINATOR®

## 480 TF

HERBIZID

Ein nicht selektives Blattherbizid mit systemischer Wirkung  
zur Bekämpfung ein- und mehrjähriger Unkraut- und Ungrasarten.

### Dominator® 480 TF

Wasserlösliches Konzentrat (SL)

Wirkstoff: **480 g/l (39,4 Gew.%) Glyphosat** (608 g/l (49,9 Gew.%) als Dimethylamin-Salz)

### Gefahrenhinweise (H-Sätze):

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH 401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

EUH 208-0253: Enthält Reaktionsprodukte von 1H-Imidazol-1-ethanol, 4,5-Dihydro, 2-(C11-17 und C17 ungesättigte Alkyl)-Derivaten und Acrylsäure. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Sicherheitshinweise (P-Sätze):

P501: Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. PAMIRA® zuführen.

### Zulassungsinhaber und Vertrieb:

ALBAUGH TKI d.o.o.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Slowenien

Tel.: +386 2 60 90 211

Für technische Fragen: +49 (0)511 9363 9469

deutschland@albaugh.eu, www.albaugh.eu

### Chargen-Nr. und Herstellungsdatum:

aus technischen Gründen an anderer  
Stelle dieser Packung.

### Notfallauskunft:

CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670

Giftnotrufzentrale: +49 (0) 6131 19240

Vor dem Einsatz kräftig schütteln!



026923-00



®eingetragene  
Marke des IVA

## GEBRAUCHSANLEITUNG

Dominator® 480 TF - Herbizid - Zul.-Nr.: 026923-00

Wirkstoff: 480 g/l Glyphosat (608 g/l als Dimethylamin-Salz) - Formulierung: Wasserlösliches Konzentrat (SL)

## **ANWENDUNGSGEBIET, WIRKUNGSWEISE UND EMPFEHLUNGEN**

### **Anwendungsgebiete:**

Dominator® 480 TF ist ein nicht selektives Blattherbizid mit systemischer Wirkung. Es wird über die grünen Teile der Pflanze aufgenommen und mit Hilfe des Saftstromes in der gesamten Pflanze, einschließlich der unterirdischen Pflanzenteile (Rhizome), verteilt. Daher werden mehrjährige Unkraut und Ungras-Arten nachhaltig bekämpft und auch einjährige Unkraut- und Ungras-Arten sicher erfasst.

### **Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 9**

### **Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete:**

<b>Anwendungs-Nr.</b>	<b>Schadorganismus/Zweckbestimmung</b>	<b>Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte</b>
026923-00/00-001	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation	Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) ausgenommen zur Saatguterzeugung und zu Brauzwecken
026923-00/00-002	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) ausgenommen zur Saatguterzeugung und zu Brauzwecken (Kornfeuchte < 25%)
026923-00/00-003	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Ackerbaukulturen
026923-00/00-004	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	Ackerbaukulturen (ausgenommen Raps)
026923-00/00-005	Acker-Kratzdistel, Schosserrüben	Zuckerrübe, Futterrübe
026923-00/00-006	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	Stilllegungsflächen; Rekultivierung
026923-00/00-007	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen	Ackerbaukulturen
026923-00/00-008	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation	Raps, ausgenommen zur Saatguterzeugung
026923-00/00-009	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse	Nadelholz, Laubholz
026923-00/00-010	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Gemüsekulturen
026923-00/00-011	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	Gemüsekulturen
026923-00/00-012	Acker-Kratzdistel, Ampfer-Arten	Wiesen, Weiden
026923-00/00-013	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	Wiesen, Weiden; Grünlanderneuerung
026923-00/00-014	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	Gleisanlagen
026923-00/00-015	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	Rasen; Rasenerneuerung
026923-00/00-016	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	Rasen; Rasenerneuerung
026923-00/02-001	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Nobilistanne, Fichte, Douglasie; Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen
026923-00/02-002	Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter	Nobilistanne, Fichte, Douglasie; Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen
026923-00/02-003	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Nordmann-Tanne; Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen
026923-00/02-004	Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter	Nordmann-Tanne; Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen

**VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE  
ANWENDUNGSGEBIETE UND -BESTIMMUNGEN, AUFLAGEN  
UND HINWEISE.**

Textliche Ausführungen zu Auflagen und Bestimmungen sind unterhalb der Liste der Indikationen aufgeführt.

**Anwendungen im Freiland im Ackerbau**

**Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen),  
ausgenommen Getreide zur Saatguterzeugung und zu Brauzwecken**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-001

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation

**Stadium Kultur:** ab Vollreife des Getreides (BBCH Stadium 89)

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** zur Spätbehandlung bis 7 Tage vor der Ernte

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NT103, WA700, NW642-1, VV835

**Wartezeit:** 7 Tage

Bodenbearbeitung direkt nach Ernte möglich.

**Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen),  
ausgenommen zur Saatguterzeugung und zu Brauzwecken**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-002

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** ab Vollreife des Getreides (BBCH Stadium 89)

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** nach dem Auflaufen der Unkräuter zur Spätbehandlung

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NT103, WA701, NW642-1, VV835

**Wartezeit:** 7 Tage

Bodenbearbeitung direkt nach Ernte möglich.

**Raps, ausgenommen zur Saatguterzeugung**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-008

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, zweikeimblättrige Unkräuter, Sikkation

**Stadium Kultur:** ab ca. 50% der Schoten ausgereift: Samen schwarz und hart (BBCH Stadium 85).

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** zur Spätbehandlung bis 7 Tage vor der Ernte

**Aufwandmenge:** 3,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NT103, NW642-1,

WA703

**Wartezeit:** 7 Tage

**Zuckerrübe, Futterrübe**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-005

**Indikation:** Acker-Kratzdistel, Schosserrüben

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 2, für die Kultur bzw. je Jahr: 2 im Abstand von 28 Tage

**Anwendungszeitpunkt:** Ab Kulturstadium 85, nach dem

Auflaufen bei Späterunkrautung. Anwendung sollte bei deutlichem Höhenunterschied zwischen Schosserrüben, Unkräutern und Kultur erfolgen. Zwei Anwendungen im Abstand von 28 Tagen haben sich gegen Nachschosser bewährt.

**Aufwandmenge:** 25%ige Streichlösung (1 Teil Dominator® 480 FT + 3 Teile Wasser).

**Anwendungstechnik:** streichen

**Sonstige Erläuterungen:**

**Hinweis zum Mittelaufwand:** maximaler Mittelaufwand für die vorgesehene Kultur pro Jahr 7,5 l/ha

**Anwendungstechnik:** Einzelpflanzenbehandlung mit Dochtstreichgerät

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** -keine-

**Wartezeit:** Zuckerrübe und Futterrübe: 60 Tage

Zur Kenntlichmachung behandelte Pflanzen Streichlösung unter Zugabe von Markierungsfarbe anmischen. Das Streichgerät ist so einzustellen, dass ein Abtropfen der Streichlösung vermieden, der Docht jedoch ausreichend befeuchtet wird. Um Folgeverunkrautung zu vermeiden sollte die Behandlung vor der Samenreife erfolgen.

**Ackerbaukulturen**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-003

**Indikation:** Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** bis 2 Tage vor der Saat

**Aufwandmenge:** 2,25 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NT103, NW642-1

**Wartezeit:** (F)

**Ackerbaukulturen**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-007

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NG404, NT103, NW642-1

**Wartezeit:** (F)

Zusätze von AHL (Ammonium-Harnstoff Lösung) sind bis 25% der Gesamtwassermenge möglich. Stoppeldüngung bzw. Kalkung frühestens 2 Tage nach der Behandlung. Unter normalen Bedingungen ist eine Bodenbearbeitung nach 7-10 Tagen möglich, unter ungünstigen Bedingungen nach 14 Tagen. Stroh räumen (kann bei geringem Strohanfall entfallen) oder häckseln und gleichmäßig verteilen. Der Nachbau aller Kulturen ist ohne Wartezeit möglich. Queckenbekämpfung: Quecke soll 3-4 neue Blätter pro Trieb gebildet haben. Zur Sanierung stark verqueckter Flächen wird je eine Anwendung in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren angeraten.

**Ackerbaukulturen ausgenommen:** Raps

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-004

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** bis Ende der Samenquellung

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** bis 5 Tage nach der Saat vor dem Auflaufen (BBCH Stadium 03, gequollener Samen, Keimwurzel noch nicht ausgetreten).

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NNG404, NT103, NW642-1

**Wartezeit:** (F)

Zur Vermeidung von Kulturschäden ist auf eine ausreichende und gleichmäßige Tiefenablage bei der Saat sowie genügend Bodenabdeckung zu achten. Den Bestand vor der Anwendung hinsichtlich Entwicklungsstadium prüfen. Bei zu später Anwendung kann es zu Schäden in der Kultur kommen. Keine Anwendung nach der Saat in Raps.

**Stilllegungsflächen; Rekultivierung**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-006

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** vor der Saat von Folgekulturen, vor der Bodenbearbeitung.

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NT103, NW642-1, VV549

**Wartezeit:** (F)

Die Aufwandmenge richtet sich nach der Leiterunkrautung. Wir

empfehlen 2,25 l/ha bei vorwiegend einjährigen Unkräutern/-gräsern und bis 3,75 l/ha bei Begrünpflanzungen bzw. mehrjähriger Unkräuter/-gräser. Mit den Bestellarbeiten kann begonnen werden, wenn die Leitunkräuter nach dem Einsatz von Dominator® 480 TF zu vergilben beginnen.

### Anwendungen im Freiland im Gemüsebau

**Gemüsekulturen**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-010

**Indikation:** Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** bis 2 Tage vor der Saat

**Aufwandmenge:** 2,25 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NW642-1, NT103

**Wartezeit:** (F)

**Gemüsekulturen**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-011

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** nach der Ernte ODER nach dem Wiederergrünen

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NG404, NT103, NW642-1

**Wartezeit:** (F)

Zusätze von AHL (Ammonium-Harnstoff Lösung) sind bis 25% der Gesamtwassermenge möglich. Stoppeldüngung bzw. Kalkung frühestens 2 Tage nach der Behandlung. Unter normalen Bedingungen ist eine Bodenbearbeitung nach 7-10 Tagen möglich, unter ungünstigen Bedingungen nach 14 Tagen. Stroh räumen (kann bei geringem Strohanfall entfallen) oder häckseln und gleichmäßig verteilen. Queckenbekämpfung: Die Quecke sollte 3-4 neue Blätter pro Trieb gebildet haben. Zur Sanierung stark verqueckter Flächen wird je eine Anwendung in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren angeraten.

### Anwendungen im Freiland im Zierpflanzenbau

**Rasen; Rasenerneuerung**

Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind / Sportplätze / Schul- und Kindergartengelände / Spielplätze / Flächen in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des Gesundheitswesens / Spiel- und Liegewiesen

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-015

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw.

je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** vor der Saat, während der Vegetationsperiode

**Aufwandmenge:** 3,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NG402, NT103, NW642-1, SF251, SF252, VV551,

**Wartezeit:** (N)

#### **Rasen; Rasenerneuerung**

Straßenbegleitgrün / Friedhöfe / Funktionsflächen auf Golfplätzen

/ Öffentliche Parks und Gärten (ohne Spiel- und Liegewiesen) / Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-016

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** vor der Saat, während der Vegetationsperiode

**Aufwandmenge:** 3,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NG402, NT103, NW642-1, SF251, SF252, VV551

**Wartezeit:** (N)

#### **Nobilistanne, Fichte, Douglasie; Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen**

-Geringfügige Verwendung-

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/02-001

**Indikation:** Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,

Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** Herbst, nach Abschluss des Wachstums, nach dem Auflaufen der Unkräuter

**Aufwandmenge:** 2,25 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen (Flächen- oder Einzelpflanzenbehandlung)

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NT103, NT118, SF275-7ZB, NW642-1, VA215, VA216, WP742

**Wartezeit:** (N)

#### **Nobilistanne, Fichte, Douglasie; Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen**

-Geringfügige Verwendung-

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/02-002

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** Herbst, nach Abschluss des Wachstums.

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen (Flächen- oder Einzelpflanzenbehandlung)

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NG404, NT103, NT118, SF275-7ZB, NW642-1, VA215, VA216, WP742

**Wartezeit:** (N)

#### **Nordmann-Tanne; Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen**

-Geringfügige Verwendung-

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/02-003

**Indikation:** Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,

Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** Herbst, nach Abschluss des Wachstums, bis einschließlich 3. Standjahr

**Aufwandmenge:** 2,25 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen (Flächen- oder Einzelpflanzenbehandlung)

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NT103, NT118, SF275-7ZB, NW642-1, VA215, VA216, WP742

**Wartezeit:** (N)

#### **Nordmann-Tanne; Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen**

-Geringfügige Verwendung-

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/02-004

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** Herbst, nach Abschluss des Wachstums, bis einschließlich 3. Standjahr

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen (Flächen- oder Einzelpflanzenbehandlung)

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NG404, NT103, NT118, SF275-7ZB, NW642-1, VA215, VA216, WP742

**Wartezeit:** (N)

#### **Anwendungen im Freiland im Grünland Wiesen, Weiden**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-012

**Indikation:** Acker-Kratzdistel, Ampfer-Arten

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** vor der Saat, während der

Vegetationsperiode

**Aufwandmenge:** 25%ige Streichlösung (1 Teil Dominator® 480 TF + 3 Teile Wasser).

**Anwendungstechnik:** streichen

**Sonstige Erläuterungen:**

Hinweis zum Mittelaufwand: maximaler Mittelaufwand für die vorgesehene Kultur pro Jahr 7,5 l/ha

Anwendungstechnik: Einzelpflanzenbehandlung mit Dochtstreichgerät

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** VV549

**Wartezeit:** 14 Tage

Zur Kenntlichmachung behandelter Pflanzen, Streichlösung unter Zugabe von Markierungsfarbe anmischen. Das Streichgerät ist so einzustellen, dass ein Abtropfen der Streichlösung vermieden, der Docht jedoch ausreichend befeuchtet wird. Um Folgeverunkrautung zu vermeiden sollte die Behandlung vor der Samenreife erfolgen.

**Wiesen, Weiden; Grünlanderneuerung**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-013

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** vor der Saat

**Aufwandmenge:** 3,0 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NG402, NT103, NW642-1, VV549

**Wartezeit:** 14 Tage

Bewährt haben sich Behandlungen und Ansaaten von Juli bis August.

**Anwendungen im Forst (auf Kahlfächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs).**

**Nadelholz, Laubholz**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-009

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** August bis September

**Aufwandmenge:** 3,75 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Sonstige Erläuterungen:**

Anwendungstechnik: nur mit Bodengeräten

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NG 404, NT103, NT118, NW642-1, VA215, VA216, VA452

**Wartezeit:** (N)

Bei der Gräserbekämpfung ist darauf zu achten, dass diese grün und in vollem Wachstum sind.

**Gleisanlagen**

**Anwendungs-Nr.:** 026923-00/00-014

**Indikation:** Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

**Stadium Kultur:** -

**Anzahl Behandlungen:** In der Anwendung max. 1, für die Kultur bzw. je Jahr: 1

**Anwendungszeitpunkt:** -

**Aufwandmenge:** 7,5 l/ha in 500 bis 1000 l/ha Wasser

**Anwendungstechnik:** spritzen

**Anwendungsbestimmungen/Auflagen:** NS660-1, NW642-1

**Wartezeit:** (N)

**Erklärungen Wartezeiten:**

(F) Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

(N) Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist ohne Bedeutung.

**ALLGEMEINE AUFLAGEN UND BESTIMMUNGEN (FÜR ALLE ANWENDUNGSGEBIETE)**

**Anwendungsbestimmungen:**

**NG352:** Bei der Anwendung des Mittels ist ein Abstand von 40 Tagen zwischen Spritzungen einzuhalten, wenn der Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen mit diesem und anderen Glyphosat-haltigen Pflanzenschutzmitteln die Summe von 2,9 kg Glyphosat/ha überschreitet.

**NW470:** Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle

**EB001-2: SP 1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen - Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

**Auflagen:**

**NN3002:** Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.

**NW261:** Das Mittel ist fischgiftig.

**SB001:** Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.

**SB005:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

**SB010:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**SB111:** Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz

und Lebensmittelsicherheit  
(www.bvl.bund.de) zu beachten.

**SB166:** Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

**SS110-1:** Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

**SS2101:** Schutanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

**SS206:** Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

**SF245-02:** Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

**Wirkungsmechanismus (HRAC/WSSA-Kode): 9**

**Hinweise:**

**NB6641:** Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

**NN1001:** Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.

## **ANWENDUNGSSPEZIFISCHE AUFLAGEN UND BESTIMMUNGEN** **(SIEHE ANWENDUNGSGEBIETE)**

### **Anwendungsbestimmungen**

**NG402:** Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2% und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-013, -015, -016*

**NG404:** Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2% und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. mit der Kanalisation verbunden sind, oder - die Anwendung im Mulch- oder

Direktsaatverfahren erfolgt. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-004, -006, -007, -009, -011, 00/02-002, 00/02-004*

**NT103:** Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14.

Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90% eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-001, -002, -003, -004, -006, -007, -008, -009, -010, -011, -013, -015, -016, 00/02-001, 00/02-002, 00/02-003, 00/02-004*

**NT118:** Bei der Anwendung des Mittels mit einem tragbaren Pflanzenschutzgerät ist in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen ein Spritzschirm zu verwenden. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-009, 026923-00/02-001, 00/02-002, 00/02-003, 00/02-004*

**SF275-7ZB:** Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Inspektion innerhalb von 7 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden. *Siehe Anwendung: 026923-00/02-001, 00/02-002, 00/02-003, 00/02-004*

**WA700:** Eine Anwendung ist nur auf Teifflächen erlaubt, auf denen aufgrund von Unkrautdurchwuchs in lagernden Beständen oder von Zwiewuchs in lagernden oder stehenden Beständen eine Beerntung nicht möglich ist. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-001*

**WA701:** Eine Anwendung ist nur auf Teifflächen erlaubt, auf denen aufgrund von Unkrautdurchwuchs in lagernden Beständen eine Beerntung nicht möglich ist. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-002*

**WA703:** Eine Anwendung ist nur auf Teifflächen erlaubt, auf denen aufgrund von Unkrautdurchwuchs oder einer sehr ungleichmäßigen Abreife eine Beerntung nicht möglich ist. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-008*

### **Auflagen**

**NS660-1:** Die Anwendung des Mittels auf Freilandflächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, ist nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig. Zu diesen Flächen gehören alle nicht durch Gebäude oder Überdachungen ständig abgedeckten Flächen, wozu auch Verkehrsflächen jeglicher Art wie Gleisanlagen, Straßen-, Wege-,

Hof- und Betriebsflächen sowie sonstige durch Tiefbaumaßnahmen veränderte Landflächen gehören. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-014*

**NW642-1:** Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

*Siehe Anwendung: 026923-00/00-001, -002, -003, -004, -006, -007, -008, -009, -010, -011, -013, -014, -015, -016, 00/02-001, 00/02-002, 00/02-003, 00/02-004*

**SF215:** Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-015, -016*

**SF252:** Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-015, -016*

**VA215:** Bei Vorhandensein von Waldbeeren (z. B. Himbeeren, Heidelbeeren, Holunderbeeren) Behandlung nur nach der Beerenerte bzw. bis zum Beginn der Beerenblüte; anderenfalls dafür Sorge tragen, dass die Beeren nicht zum Verzehr gelangen. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-009, 00/02-001, 00/02-002, 00/02-003, 00/02-004*

**VA216:** Bei Vorhandensein von Wildkräutern dafür Sorge tragen, dass diese nach der Behandlung nicht geerntet werden. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-009, 00/02-001, 00/02-002, 00/02-003, 00/02-004*

**VA452:** Nicht anwenden bei Vorhandensein von Pilzen; anderenfalls dafür Sorge tragen, dass die Pilze nicht zum Verzehr gelangen.

*Siehe Anwendung: 026923-00/00-009*

**VV549:** Behandelten Aufwuchs (Abraum vor der Neueisat) nicht zur Heugewinnung verwenden, er kann der direkten Verfüterung oder der Silierung dienen. *Siehe Anwendung: 026923-00/006, -012, -013*

**VV551:** Behandelten Aufwuchs (Abraum vor der Neueisat) weder zur Kleintierfütterung noch zur Kleintierhaltung verwenden. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-015, -016*

**VV835:** Stroh von behandeltem Getreide nicht für Kultursubstrate verwenden. *Siehe Anwendung: 026923-00/00-001, -002*

**WP742:** Anwendung nach völligem Abschluss des Kulturpflanzenwachstums, d.h., wenn die Knospen verholzt und braun gefärbt sind, anderenfalls sind Schäden an der Kulturpflanze möglich. *Siehe Anwendung: 026923-00/02-001, 00/02-002, 00/02-003, 00/02-004*

## WIRKUNGSSPEKTRUM

**Gut bekämpfbar sind:** Adlerfarn, Amper-Arten, Ausfallgetreide, Bärenklau, Beifuß-Arten, Berufskraut-Arten, Bingelkraut, Birsen-Arten, Borstenhirse-Arten, Große Brennnessel, Distel-Arten, Ehrenpreis, Eberesche, Fingerhirse-Arten, Fingerkraut-Arten, Fuchsschwanzgewächse, Weißer Gänsefuß, Gundermann, Hahnenfuß-Arten, Hühnerhirse, Kamille, Rotklee, Klettenlabkraut, Knaulgras, Flohknöterich, Landwasserknöterich, Kornblume, Kreuzkraut, Gemeiner Löwenzahn, Mäusegerste, Gemeine Melde, Minze, Wilde Möhre, Mohn, Nachtschatten, Phacelia, Gemeine Quecke, Rainfarn, Winterarras, Rasenschmiege, Einjährige Rispe, Saatwucherblume, Seggen-Arten, Acker-Stiefmütterchen, Schilfrohr, Taubnessel, Vogelmiere, Wiesenkerbel, Wicken-Arten, Großer Wiesenknopf, Ackerwinde.

**Waldbaulich ausreichend bekämpfbar sind:** Eiche, Gewöhnliche Esche, Eberesche, Faulbaum, Hainbuche, Hundsrose, Heckenkirsche.

**Nicht bekämpfbar sind:** Salbeigamander, Gewöhnlicher Giersch, Weißer Mauerpfeffer, Acker- und Sumpfschachtelhalm, Kleine Brennnessel, Weißklee.

## NACHBAU

Durch die rasche Inaktivierung des Wirkstoffes von Dominator® 480 TF können alle Kulturen ohne Einschränkung in kürzester Zeit nachgebaud werden.

## MISCHBARKEIT

Zu Mischungen mit schwefelsaurem Ammoniak (SSA), AHL (Markenprodukt) oder weiteren Produkten bitte Fachberatung anfordern. Beimischungen von Herbiziden zur Spritzbrühe können die Wirkung von Dominator® 480 TF u.U. einschränken.

## ALLGEMEINE HINWEISE

### Anwendungshinweise

Dominator® 480 TF kann während der gesamten Vegetationsperiode eingesetzt werden. Der Einsatz kann sogar vor oder nach kurzen Nachfrösten bis -3°C erfolgen. Es ist zu beachten, dass die zu bekämpfenden Unkrautarten genügend aufnahmefähige Blattmasse gebildet haben und ausreichend benetzt werden. Zur nachhaltigen Bekämpfung von hartnäckigen Unkräutern wird die Anwendung im Blühstadium empfohlen. Bei anhaltender Trockenheit oder bei hohen Temperaturen, verbunden mit extrem niedriger Luftfeuchtigkeit, können Wirkstoffaufnahme und Wurzel-/Rhizomverlagerung beeinträchtigt werden. Verringerungen der empfohlenen Aufwandmenge sind bei allen, insbesondere nicht optimalen Anwendungsbedingungen, nicht angeraten. Anwendung nach Regen oder bei Tau auf feuchten, aber nicht tropfnassen Unkrautbestand möglich!

Je aktiver die Pflanzen wachsen, umso schneller wird der Wirkstoff in der Pflanze verteilt. Bei normal wüchsiger Witterung tritt innerhalb von ca. 7-10 Tagen die sichtbare Wirkung von Dominator® 480 TF ein. Die Pflanzen welken, werden gelb und vertrocknen später vollständig. Ein langsamer Eintritt von Wirkungssymptomen hat auf die Nachhaltigkeit der

Wirkung keinen Einfluss. Abdrift auf benachbarte Kulturen und andere Pflanzenbestände unbedingt vermeiden. Niedrige Wasseraufwandsmengen bis max. 200 l/ha ergeben die optimale Wirkung.

## Herstellung und Ausbringung der Spritzbrühe

### Allgemeine Hinweise:

Nur technisch einwandfreie, geprüfte Spritztechnik einsetzen. Immer nur so viel Spritzbrühe ansetzen, wie gebraucht wird. Überdosierungen und Abdrift sind zu vermeiden. Auf gute und gleichmäßige Verteilung achten, evtl. Gerät auf Prüfstand überprüfen. Technisch bedingte Restmengen der Spritzbrühe im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und bei laufendem Rührwerk auf der behandelten Fläche ausspritzen.

### Spritzbrühmenge:

Gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanweisung.

### Ansetzen der Spritzbrühe:

Dominator® 480 TF Behälter gut schütteln. Spritztank mit 1/2 der erforderlichen Wassermenge füllen, Rührwerk einschalten (Nennrehzahl) und Dominator 480 TF bei eingeschaltetem Rührwerk zugeben. Den entleerten Kanister intensiv mit viel Wasser ausspülen und das Spülwasser der Spritzflüssigkeit zufügen. Den Rest der erforderlichen Wassermenge anschließend bei laufendem Rührwerk einfüllen. Bei laufendem Rührwerk umgehend nach Ansatz ausspritzen.

### Weitere Hinweise:

Bei Tankmischungen mit trocken formulierten Mischungspartnern sind diese zuerst in den Spritztank zu füllen. Insbesondere bei Tankmischungen mit Dominator® 480 TF ist auf die gute Durchmischung der Brühe zu achten. Bei Arbeitsunterbrechungen das Rührwerk laufen lassen. Nie mehr Spritzbrühe ansetzen, als unbedingt gebraucht wird.

### Gerätereinigung

Rückstände von Dominator® 480 TF im Spritzgerät können Schäden an nachfolgend behandelten Kulturen verursachen. Daher muss das Spritzgerät (Außenseite, Deckel, Gestänge, Düsen) nach der Anwendung sorgfältig gespült werden.

Für eine gründliche Tankreinigung bietet Albaugh den Tankreiniger OMEN® (0,5 l je 100 l Wasser) an. Innen- und Außenreinigung auf dem Feld vornehmen. Das Spülwasser auf der vorher behandelten Fläche ausspritzen. Technisch unvermeidbare Restmengen im Verhältnis 1:10 verdünnen und auf der vorher behandelten Fläche ausbringen.

1. Den Tank leeren und die Außenseiten waschen, um Kontaminationen zu entfernen.
2. Die Innenseite des Tanks spülen, bis der Tank mit etwa 10% seiner Kapazität gefüllt ist. Danach den Inhalt durch die Spritzvorrichtung entleeren.
3. Nun den Tank zu 20% mit Wasser füllen und ein geeignetes Reinigungsmittel zugeben. Das Rührwerk einschalten und den Inhalt durch die Spritzvorrichtung entleeren.
4. Im Anschluss den Tank erneut zu 20% mit Wasser füllen und

für mindestens 15 Minuten das Rührwerk laufen lassen. Erneut spülen, bis der Tank geleert ist. Sollte sich der Tank nicht komplett leeren, die Prozedur erneut mit Reinigungsmitteln wie oben beschrieben durchführen.

5. Sprühdüsen und alle Filter entfernen, reinigen und in Wasser einweichen.
6. Eine letzte Spülung des Spritztanks mit mindestens 10% des Tankinhaltes durchführen und anschließend trocknen lassen. Reste von Reinigungswasser nicht über die Hofabläufe in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen. Reste von Reinigungswasser dürfen auf keine anderen Kulturflächen mit empfindlichen Kulturen gelangen.

## TRANSPORT UND LAGERUNG

### Transport

Das Produkt darf während des Transports nicht unter -10°C abkühlen.

Das Produkt darf während des Transports nicht über 30°C erhitzen.

### Lagerung

**LGK12**

(Lagerklasse nach TRGS 510)

Dominator® 480 TF und die daraus hergestellte Spritzbrühe nicht in galvanisierten oder unbeschichteten Weichmetallbehältern lagern. Frostfrei lagern! Produkt so lagern, dass Betriebsfremde und Kinder keinen Zugang haben. Nicht zusammen mit Arzneimitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln lagern. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen! Trocken aufbewahren und so lagern, dass das Produkt nicht unter -10°C abkühlt. Trocken aufbewahren und so lagern, dass das Produkt nicht über 30°C erhitzt wird.

## ENTSORGUNG/UNBEABSICHTIGTE FREISETZUNG

### Entsorgung

Spritzbrühreste vermeiden! Stets nur die Spritzbrühmenge ansetzen, die unbedingt gebraucht wird! Abfallbeseitigung bei Gebinden < 20 l: Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA® sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA® mit separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet unter [www.pamira.de](http://www.pamira.de). Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung. Abfallbeseitigung bei IBCs: Siehe Euro-Ticket! Rücknahme beachten!

### Unbeabsichtigte Freisetzung

Tritt Produkt aus, wie folgt verfahren:

1. Produktkontakt vermeiden - Dämpfe nicht einatmen!
2. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen!
3. Geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzstiefel, Schutzbrille) anlegen.

4. Produkt am Fortfließen hindern und nicht wegsülen! Sofort mit saugfähigem Material aufnehmen und in verschleißbare Behälter füllen.
5. Verschmutzte Umgebung und Geräte mit feuchtem Lappen reinigen.
6. Reinigungsmaterial und verunreinigte Packmittel ebenfalls in verschleißbare Behälter füllen.
7. Bei Produktkontakt und nach Ende der Arbeit gründlich waschen.
8. Dichte, aber vom Produkt verunreinigte Packungen aussortieren. Hersteller/Vertriebsfirma benachrichtigen und Weisungen einholen.
9. Abfälle mit den örtlich zuständigen Stellen (z.B. Stadt- oder Kreisverwaltung) umgehend sicher entsorgen.

### **ERSTE HILFE**

Sollten durch unsachgemäße Handhabung oder Missbrauch Vergiftungserscheinungen auftreten, sofort den Arzt rufen!

#### **Hinweise für den Arzt**

Sofortmaßnahmen: Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung. Siehe auch Sicherheitsdatenblatt. Toxikologische Beratung bei Vergiftungsfällen: II. Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Mainz, Tel.-Nr. 06131 19240 und Telefax-Nr. 06131 232468; Notfalltelefon für allgemeine Notfälle (Unfall, Brand, Umwelt-/Ökologieereignisse) CARECHEM: +44 (0) 1235 239 670 (24h).

### **ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE/HAFTUNG**

#### **Haftungsbedingungen**

Die für das vorliegende Produkt verwendete Gebrauchsanleitung gründet sich im Wesentlichen auf Regelungen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), die diese im Zulassungsbescheid des Referenzmittels getroffen hat. Nichtsdestoweniger können die Wirkungen dieses Produktes durch Bedingungen beeinflusst werden, auf die weder der Hersteller noch Vertreiber noch unsere weiteren Geschäftspartner Einfluss haben. Es handelt sich unter anderem um Wetter- und Bodenbedingungen, Vielfalt der Kulturen, Anwendungszeitpunkt, Wassermenge, Anzahl der Anwendungen, Ausbringungsmethoden und -geräte, Fruchtfolge, regionale Faktoren, das Auftreten und die Entwicklung von Resistenzen gegen den Wirkstoff oder gegen das Pflanzenschutzmittel und Bedingungen der Lagerung und des Transportes. Unter bestimmten Umständen können die Wirkungen des Mittels auch Schäden an der Kultur verursachen. Hersteller und Vertreiber des Produktes sowie unsere weiteren Geschäftspartner übernehmen für die vorgeschilderten Umstände oder daraus herrührende Folgen keine Haftung. Dies gilt auch für Folgen der Veränderung des Produktes durch Mischungen mit anderen Pflanzenschutzmitteln und Stoffen, die nicht ausdrücklich in der Gebrauchsanleitung empfohlen werden. Deswegen bleibt der Anwender des Mittels insbesondere im Rahmen guter fachlicher Praxis verpflichtet, sich über den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln sachkundig zu machen, und die Anwendungsfähigkeit des Mittels unter Berücksichtigung

der vorgenannten örtlichen und zeitlichen Faktoren zu prüfen. Dabei ist der Anwender auch verpflichtet, bestehende Gesetze und Rechte Dritter sowie die Festsetzungen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit einzuhalten. Soweit das BVL über die grundsätzlich festgesetzten Anwendungsgebiete hinaus eine weitere Anwendung nach § 18 a Pflanzenschutzgesetz oder nach Art. 51 der Verordnung (EG) 1107/2009 genehmigt hat (geringfügige Verwendung), handelt es sich insoweit um ein Anwendungsgebiet, welches nicht im Zulassungsverfahren ausgetestet wurde. Weder Hersteller, Vertreiber noch unsere weiteren Geschäftspartner können deswegen eine Haftung für die Wirksamkeit des Mittels und das Ausbleiben von Schäden bei Anwendung des Mittels in einem nach § 18 a PflSchG genehmigten Anwendungsgebiet übernehmen.