



Magnello®

NEU

FUNGIZID

+ Stark gegen Fusarium-Arten und andere Ährenkrankheiten

+ Erfasst auch Schwärzepilze für sauberes Stroh

+ Sichere Ährenbehandlung ohne Prothioconazol – Azole schützen!

Wirkstoffe	250 g/l Tebuconazol, 100 g/l Difenoconazol		
Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC)		
Wirkstoffgruppe	Tebuconazol Difenoconazol	Triazol Triazol	FRAC 3 FRAC 3
Wirkungsweise	Protektiv und kurativ		
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Systemisch		
Kultur (Stadien)	Weizen* BBCH 51 – 61: Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum), Septoria Blattdürre (Septoria tritici) BBCH 51 – 69: Braunrost (Puccinia recondita) BBCH 61 – 69: Fusarium-Arten *Nebenwirkung auf Schwärzepilze wie Alternaria sp., Cladosporium, Drechslera (Helminthosporium)		
Aufwandmenge	1,0 l/ha in 200–400l/ha Wasser		
Abstandsauflagen Weitere Auflagen im Tabellenteil	Hang > 2 %:	0m	
	Oberflächengewässer	NW 605-1 (50 % 5 m, 75 % *, 90 % *) NW 606 (5m)	
	Saumstrukturen	–	
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)		
Gebindegröße	5l		

Magnello® – Anwendungsempfehlung

	 BBCH 33	 37	 45–49	 51–55	 57–59	 61–69
Blatt- und Spelzenbräune (<i>Septoria nodorum</i>) Septoria Blattdürre (<i>Septoria tritici</i>)				Magnello® 1,0 l/ha		
Braunrost (<i>Puccinia recondita</i>)				Magnello® 1,0 l/ha		
Fusarium-Arten						Magnello® 1,0 l/ha