

# Vastimo®

## FUNGIZID

Das einzige Carboxamid-Azol mit Metconazol zur Resistenzvorbeugung

Hervorragende Gewässerabstands- und keine Hangauflage


Breites Wirkungsspektrum mit zuverlässiger Wirkung auf Roste

<b>Wirkstoffe</b>	62,5 g/l Fluxapyroxad, 45 g/l Metconazol		
<b>Formulierung</b>	Emulsionskonzentrat (EC)		
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Fluxapyroxad: Carboxamid Metconazol: Triazol	FRAC C2 FRAC G1	
<b>Wirkungsweise</b>	Protektiv und kurativ		
<b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>	Systemisch		
<b>Kultur (Stadien)</b>	Weizen inkl. Dinkel und Durum Gerste Roggen Triticale (BBCH 30–61)		
<b>Aufwandmenge</b>	2 l/ha in 100–300 l/ha Wasser		
<b>Abstandsauflagen</b> <small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small>	Hang > 2%:	0 m	
	Oberflächengewässer	NW605-1, 606: 5 m (50 % & Standard), Länderrecht (75 % & 90 %)	
	Saumstrukturen	–	
<b>Bienenschutz</b>	Nicht bienengefährlich (B4)		
<b>Gebindegröße</b>	10 l		

## Einsatzkulturen (Schwerpunkte) und Anwendungsempfehlung

Einfach- oder Mehrfachbehandlung je nach Befalls- und Sortenanfälligkeit.

### Regionalberatung kontaktieren



## Resistenzmanagement mit Vastimo® garantiert!

Da zum T1-Termin oftmals Prothioconazol appliziert wurde, folgt zu T2 Vastimo® mit Metconazol.

T1: Prothioconazol



T2: Vastimo® mit Metconazol



**Beste Rostwirkung bei Heilung und Vorbeugung!**

## Wirkungsspektrum

Weizen	
Braunrost (bis BBCH 69)	++++
Gelbrost	++++
Blatt- und Spelzenbräune	++++
Septoria-Blattdürre	++++
DTR-Blattdürre	+++
Echter Mehltau	++
Halmbruchkrankheit	++
Fusarium	++

Gerste	
Rhynchosporium	++++
Zwergrost	++++
Gelbrost	++++
Netzflecken	+++
Echter Mehltau	++
Physiologische Blattflecken	++
Halmbruchkrankheit	++
Sprengelkrankheit	+

Roggen	
Rhynchosporium	++++
Braunrost (bis BBCH 69)	++++
Echter Mehltau	++
Halmbruchkrankheit	++

Triticale	
Braunrost (bis BBCH 69)	++++
Gelbrost	++++
Septoria-Arten	++++
Echter Mehltau	++
Fusarium	++


Wirkung:

++++ Sehr gut    +++ Gut    ++ Mittel    + Teilwirkung

## Bekämpfung von Blattkrankheiten

### Wintergerste


Applikation: In dem Versuch wurde die Leistung der Mittel in einer Einfachbehandlung in BBCH 39–55 geprüft.



**Fazit:** Der Einsatz von Vastimo® zu T2 erzielte einen durchschnittlichen Mehrertrag von 10,50 dt/ha im Vergleich zur Kontrollvariante.

### Winterweizen

Applikation: In dem Versuch wurde die Leistung der Mittel in einer Einfachbehandlung zu T2 geprüft.



**Fazit:** Der Einsatz von Vastimo® zu T2 erzielte einen Ertragszuwachs von 5,50 dt/ha im Vergleich zur Kontrollvariante.